Plantes nouvelles, rares ou critiques des serres du Muséum.
(Notules sur quelques Orchidées d'Indochine, x).

Par A. Guillaumin.
professeur au muséum.

199. — *Saccolabium albo-lineatum* Teijsm. et Binn. — Laos : plateau des Boloven (*Tixier* f. 18, 1955).
Pas encore signalé au Laos.

192. — *S. calceolare* Lindl. — Annam : Dalat (*C. R. S. T.*, nº 179, f. 42, 1955). Déjà reçu de cette région.

200. — *Dendrobium Nathalienis* Reichb. f. var **minor** de Sigaldi in litt. var nov. *Foliis pro portione minoribus* (1 cm. *longis*) *et crassioribus* ; *floribus 2-plo minoribus.*
Annam : région de Dalat, Chutes de Gougat, au Trou du Diable (*C. R. S. T.*, nº 182/Sig., f. 65, 1955).
Les fleurs jaune pâle à tache plus foncée près du sinus apical du labelle ont la même organisation que celles du type mais sont au moins 2 fois plus petites ce qui correspond à l'échantillon *Kerr* 0292 du Siam.

201. — **Dendrobium parcoides** Guillaum. sp. nov.

Caulis gracilis (3-4 *mm diam.*), *supra basin leviter incrassata* (7 *mm diam.*, 40-50 cm. *longa, supra ramosa. Folia linearia* (3-6 *cm* × 0,4-0,7 *cm*), *acuta, tenuia, citissime caduca. Flores apice vel ad apicem solitares vel bini, virides limbo flavescente et flavo transiente, pedicello ovarioque gracilibus, sepalis dorsali ovato,* (4 *mm* × 3 *mm*), *obtuse rotundato, 1- nervio, lateralibus ovatis* (6 *mm* × 3 *mm*), *obtusis, petalis spathulatis* (3 *mm* × 1,5 *mm*), *rotundato-truncatis, labello ungue lineari* (5 *mm* × 3 *mm*), *limbo transverse elleptico, ungue latiore, 2 1/2- plo breviore, apice leviter emarginato, mento rotundato, 2 mm longo, incurvo, columna 5 mm longa, 3 mm lata, apice filiformi, stetidiis acutis, anthera operculo conico, obtuso 1,5 mm alto.*
Annam : Dalat (*C. R. S. T.* nº 147. Sig, f. 108, 1954).

Voisin de *D. parcum* Reichb. f. du Tenasserim et du Siam mais feuilles aigües et non obliquement obtuses, petales spatulés, pas de ponctuations rouges sur le labelle dont l'onglet n'est pas dilaté de la base au sommet mais de largeur égale sur toute sa longueur et stélidiés non arrondies.

202. — **Coelogyne nigro-furfuracea** Guillaum. sp. nov.

Pseudobulbi maximi, globosi. Folia magna, lanceolata (ultra 40 cm × 6 cm), apice basique acuta, petiolo..., scapus basi pseudobulbi oriens, breviter hisutus, basi..., bracteis traingularibus (8 mm × 3 mm), apice caudatim acuminatis, 5-nerviis, utroque pagina breviter hirsutis ; flores circa 12, succedanei, pedicello ovarioque 2,5 cm longis, luteis, breviter hirsutis, facie superiore ad basin nigro-furfuraceis, sepalis superiore anguste elliptico (15 mm × 4 mm), 7-nervio, extra piloso, lateralibus oblique triangularibus, 15 mm longis, basi 5 mm latis, 7-nerviis, extra pilosis, petalis linearifiliformibus sed apice leviter spathulatis, 17 mm longis, 1- nerviis, ut sepalis vinosis, nervis atro purpureis et apice luteis, labello atro purpureo, integro, fere lineari, apice rotundato et levissime dilatato (14 mm × 3 mm), haud ornato, columna obtuse alata.

Annam : Dalat : Mauline, 1.600 m (*C. R. S. T.*, nº 141 / Sig., f. 3, 1954 ; f. 42, 1955.

Rentre dans la série *Succedanae* de Pfitzer et Kränzlin (*Pflanzenreich*, IV, 50, II, B, 7, p. 21) ; à rapprocher de *C. longifolia* Lindl., remarquable par les poils aplatis noirs qui ornent en dessus le pédicelle vers sa base.

150. — *Bulbophyllum semiteretifolium* Gagnep.

Annam : Dalat (*C. R. S. T.*, nº 185 / Sig., *Frère Paul* leg. f. 165, 1955).

Déjà reçu de cette localité.

Plantes d'Indochine autres que les orchidées.

203. — *Urostachys obovalifolius* Hert. — Nord Viet Nam (*C. R. S. T.*, nº 295/Lên, f. 3 ; 1954) « *Rôu rông* » = Barbe de dragon.

204. — *Dischidia Rafflesiana* Wall. — Annam : Dalat (*C. R. S. T.*, nº 290/Lên, f. 210, 1953). Signalé au Siam, en Cochinchine mais pas encore en Annam.

205. — *Hoya obovalis* Dene. — Annam : entre Dalat et Djiring, non loin du Oquhum, forêt claire (*C. R. S. T.*, nº 284/Lên, f. 210, 1953). Signalé au Siam, en Cochinchine et au Laos mais pas encore en Annam.

206. — *Aeschynanthus Evrardii* Pellgr. — Annam : Dalat (*C. R.S. T.*, nº 21, f. 183, 1954) ; *AE Hosseusii* Pellgr. ? — Annam : Dalat (*C. R. S. T.*, nº 7/S 4, f. 191, 1953). La première de ces espèces avait été découverte à Dalat mais la seconde n'était connue que du Siam.

207. — *Begonia martabanica* A. DC. — Annam : Chutes d'Ankala (*C. R. S. T.* f. 1, 1954). Correspond à la description quoique la tige ne dépasse pas 2 cm. de longueur ; très semblable à l'échan-

tillon de *Griffith* 2.598 (non cité dans la *Flora of British India*), de l'East Himalaya, mais non à celui de *Kerr* 26.811, du Siam.

208. — *Burmannia disticha* L. — Annam : Dalat (*C. R. S. T.*, nº 156/ Sig., f. 158, 1954).

209. — *Myrmecodia tuberosa* Bl. — Annam : région de Dak son (Banthuomot) et de Blao (*C. R. S. T.*) — Pas signalé dans la *Flore de l'Indochine* III.

210. — *Hydnophytum formicarium* Jack. — Annam : Dalat (*C. R. S. T.*, f. 158 et 180, 1954). — Signalé en Cochinchine et au Siam.

211, — *Kalanchoe laciniata* DC. — Annam : Dalat (*C. R. S. T.*, f. 42, 1955).